Clínica NuevaCostanera

INSTALACIÓN DE PELLET ANTIALCOHOL

Pellet Alcoholismo

¿En qué consiste el tratamiento con Pellets de Disulfiram?

Pellet alcoholismo es el tratamiento más efectivo contra el consumo patológico de alcohol debido a que permite a los pacientes vivir de una forma óptima sin riesgo a recaer y sin preocuparse de tomar el medicamento a diario. El implante de pellets de Disulfiram es un método de **APOYO** al tratamiento para lograr dejar el abuso de alcohol. El implante **NO** quitará la ansiedad de beber alcohol. Pero si producirá reacciones físicas frente al consumo de alcohol, es decir es una terapia **AVERSIVA**.

Al ser un método de apoyo, el tratamiento debe incluir una terapia integral, en la cual el paciente explore las causas de su problema y aprenda técnicas que lo ayuden a controlar la ansiedad por beber. Puede ser tanto como con Psicólogo o Psiquiatra.

¿Cuánto dura la efectividad del tratamiento?

Teniendo en cuenta que cada persona puede reaccionar de manera distinta a cualquier tratamiento, la media de el efecto cuando se toma vía oral (en pastillas) es de 48 a 72 horas y cuando es vía intradérmica y en forma de pellets el efecto se puede prolongar hasta 4 a 8 meses. **Hay que tener en cuenta que <u>hay pacientes que el tratamiento de Pellet no es efectivo</u>, eso no se puede saber hasta después de haber instalado los dispositivos, en esos casos se necesita posteriormente un refuerzo con pastillas. (Antabus).** Por lo que no habrá reembolso en el caso que no sea efectivo el tratamiento.

¿Cuáles son las contraindicaciones para colocarse un pellets?

Está **CONTRAINDICADO** colocar implantes de pellets en pacientes con:

- Problemas Cardiovasculares.
- Insuficiencia Hepática. (problemas al hígado)
- Insuficiencia Renal Grave. (mal funcionamiento del riñon)
- Pacientes Diabéticos descompensados.
- Hipotiroidismo. (problemas a la tiroides)
- Enfermos en que se sospeche epilepsia o presenten trastornos NeuroPsiquiatricos graves.
- Mujeres embarazadas o en plan de hacerlo.
- Alergias al medicamento
- Uso de otros medicamentos que interactúen con el Disulfiram: ej. Metronidazol, Fenitoina, etc.

¿El tratamiento tiene efectos secundarios o complicaciones?

El Disulfiram provoca un efecto antabus; provocando reacción alérgica, mareos, vértigo, vómitos, depresión respiratoria o eventos cardiovasculares en pacientes con patología cardiaca previa. Esto ocurre cuando el paciente consuma alcohol mientras este en el tratamiento con el medicamento, por esto su funcionamiento es a través de la abstención por las consecuencias que le provoca

Como todo medicamento tiene efectos secundarios:

- Se metaboliza en el hígado, por lo que no se recomienda en pacientes con daño hepático crónico.
- Existe un impacto leve en el apetito sexual.
- Aun no hay estudios que confirmen categóricamente su riesgo cancerígeno.
- Los riegos propios del procedimiento y la instalación son:
    - Hematoma local o sangramiento de la zona operatoria
    - Necrosis grasa e infección de la herida.
    - Un porcentaje variable, entre 5 a 10% desarrolla una reacción a cuerpo extraño con los pellets; y en estos casos se recomienda que estos sean retirados.

RECOMENDACIONES PRE y POST INSTALACION

NO DEBE BEBER ALCOHOL 48 HRS PREVIAS A LA INSTALACIÓN.

Es importante que el paciente y su familia conozcan los efectos del medicamento, y que estos se pueden producir al tener contacto con alcohol en sus distintas presentaciones y en cantidades mínimas (comidas, salsas, vinagres, enjuagues bucales, jarabes para la tos, perfumes, desodorantes, etc.).

✓ Como protocolo, previo a la instalación se solicita que el paciente tenga una entrevista con el médico que realizara la evaluación (previo al procedimiento) donde se definirá si hay contraindicaciones, si es factible y recomendable realizar el procedimiento.

✓ **Idealmente el paciente debe contar con terapia de apoyo y/o derivado por su psiquiatra o psicólogo tratante, además de contar con los exámenes que el médico le solicite en el control previo a la instalación.**

✓ El paciente debe comprometerse en asistir a los controles, ya que algunas complicaciones ocurren hasta 15 días después de instalado el pellets (ejemplo: reacción a cuerpo extraño).

✓ El día del procedimiento posterior a la instalación poner frio local e la zona y los dias siguientes poner calor local para ayudar a la reabsorción del hematoma (si es que hubiese uno).

✓ **NO MANIPULAR EL PARCHE NI LA ZONA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN y TOMAR LOS MEDICAMENTOS INDICADOS POR EL MÉDICO.**

✓ Si presenta signos de infección (Fiebre, Salida de Pus en la herida, y dolor en la zona que no cede con los analgésicos) Comuníquese con nosotros y asista a los controles que sea citado/a.

✓ Ante complicaciones locales de la herida (eritema, es decir que se coloque roja; aumento de volumen, dolor y/o cualquier molestia) lo más importante es la consulta precoz para evaluar.

✓ Se recomienda controlar pruebas hepáticas a los 2 meses de la instalación.

Fecha de Retiro de Puntos: _____/_____/_____ HORA_____:_____

Fecha de Curación (si correspondde)_____

Fecha de Alta de Curaciones _____

Cualquier duda o consulta, comunicarse con nosotros vía correo electrónico info@clinicanc.cl o a nuestros teléfonos +56 22 602 3750 - +56 22 602 3751 o **vía whatsapp** +56 9 94502326